


SARS-CoV-2 Antikörpertest

Was verwendet Ihr Labor?

Innovative, schnelle und klinisch erprobte SARS-CoV-2 Diagnostik auf dem bewährten vollautomatisierten Maglumi-System ermöglicht eine differenzierte Diagnose (Früh- und Spätphase) durch spezifischen IgM- und IgG-Nachweis. CE 



Sprechen Sie uns gerne jederzeit an
... und fragen Sie Ihr Labor.
www.maglumi.de

Weitere Informationen siehe Rückseite



**Nukleokapsid-
Phosphoprotein N**


Spike Glykoprotein S

RNA Genom

Hülle
(Envelope)

E Protein

Membranprotein M



medac

Sprechen Sie uns gerne an!

medac GmbH
Theaterstraße 6
D-22880 Wedel



www.maglumi.de

Dr. Reiner Ahrendt
Tel.: +49 (0)4103 8006-8024
r.ahrendt@medac.de

www.medac.de / www.medac-diagnostics.de

WD-2290/06.2020

Hohe Sensitivität

- ✓ Chemilumineszenz-Immunoassay
- ✓ N- und S-Antigene verwendet

Hohe Spezifität

- ✓ Keine Kreuzreaktionen zu anderen Coronaviren
- ✓ Hochspezifische rekombinante Antigene
- ✓ μ -capture-Technologie

Schnelles System

- ✓ Erste Ergebnisse nach 35 Minuten

Effiziente Laborroutine

- ✓ Gleichzeitige Abarbeitung von bis zu 100 weiteren Parametern

Absolut zuverlässig

- ✓ Unabhängige Studien
- ✓ Routinebewährt in Italien und Spanien
- ✓ In 20 europäischen Ländern eingesetzt